

Splnění kritérií pro diagnózu migréna s aurou, bez aury nebo chronická migréna (ICHD-3: 1.1, 1.2, 1.3; MKN: G43.0, G43.1, G43.2, G43.3, G43.8, G43.9)

- Časový údaj, kdy migréna u pacienta začala (rok)
- Frekvence dní s migrénou za měsíc (MMD) v posledních 3 měsících
- Frekvence MMD v posledním měsíci
- Terapie akutního záchvatu (aktuální užívaná medikace)
- Přehled doposud aplikované profylaktické terapie (tabulka jako vzor) u jednotlivých přípravků:

	dokumentované datum zahájení léčby a ukončení léčby (alespoň u 2 profylaktik)	maximální denní dávka	pokračuje/nepokračuje	důvod vysazení (selhání účinku nebo intolerance nebo jiné)
Topiramát	2. 1. 2020 – 16. 4. 2020	50 mg	nepokračuje	bez efektu
Metoprolol	22. 12. 2019 – 31. 12. 2019	25 mg	nepokračuje	intolerance: vertigo, presynkopy

- Přiložit deník MMD, vedený nejméně poslední 3 měsíce

Materiál byl vytvořen ve spolupráci s MUDr. Tomášem Nežáďalem, Ph.D., neurologické oddělení Ústřední vojenské nemocnice v Praze a Teva Pharmaceuticals CR, s.r.o., Sokolovská 651/136A, 180 00 Praha 8, www.teva.cz, tel.: +420 251 007 111

Indikace nasazení CGRP protilátek v ČR

- Pacienti nad 18 let s EM (> 4 MMD) nebo CM v posledních 3 měsících
- Selhání 2 předchozích profylaktických terapií ze 2 rozdílných skupin

Skupina 1	Topiramát
Skupina 2	Valproát*
Skupina 3	Betablokátory (metoprolol, propranolol**, bisoprolol**)
Skupina 4	Antidepresiva (amitriptylin a venlafaxin**)
Skupina 5	Blokátory kalciových kanálů (flunarizin*** a cinarizin)

*kontraindikován u dívek a žen ve fertilním věku; **léky neregistrované k léčbě migrény, ale s prokázanou účinností;

***dříve registrovaný v ČR pro terapii migrény

Nejméně 3 měsíce podávání k potvrzení selhání účinku

- podáváno alespoň 1 antiepileptikum (skupiny 1 a 2)
- alespoň u 1 léku prokazatelné selhání efektu
- intolerance profylaktika nebo závažné komorbidity